

## Experiment 10: Benzil থেকে Benzilic Acide প্রস্তুতি

**পদ্ধতি:** বেনজিল থেকে বেঞ্জিলিক অ্যাসিড প্রস্তুতির জন্য বেঞ্জিলিক অ্যাসিড পুনর্বিন্যাস (Benzilic Acid Rearrangement) নামক একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়, যেখানে বেঞ্জিলকে একটি ক্ষার, যেমন পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH) বা সোডামাইড (NaNH<sub>2</sub>) এর সাথে বিক্রিয়া করানো হয়, যা একটি  $\alpha$ -হাইড্রক্সি কারবক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি করে। প্রথমে একটি ক্ষারের জলীয় বা অ্যালকোহলীয় দ্রবণে বেনজিলকে উত্তপ্ত করে বেনজিলিক অ্যাসিডের লবণ তৈরি করা হয়, যা পরে অ্যাসিডিক করা হলে বেনজিলিক অ্যাসিড অধঃক্ষিপ্ত হয়।


### প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বস্তু:

বেনজিল: ১ গ্রাম

KOH/ NaOH: ১ গ্রাম

Conc. HCl

### বিক্রিয়া:



### পদ্ধতি:

- ১) এক গ্রাম Benzil(s) এবং এক গ্রাম KOH/NaOH(s) প্রথমে গুঁড়ো করে নেওয়া হল।
- ২) এই গুঁড়ো রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে একটি শুকনো কনিক্যাল ফ্লাস্কে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নিয়ে ২০ মিনিট Water bath এ উত্তপ্ত করা হলো।
- ৩) তারপর পাত্রটিকে ঠান্ডা করা হলো। এবং অল্প পরিমাণ জলে দ্রবীভূত করার চেষ্টা করা হলো। এরপর দ্রবণটিকে ফিল্টার করে নেওয়া হল।
- ৪) এরপর দ্রবণটিকে conc. HCl দ্বারা ড্রপ ড্রপ করে অম্লায়িত করা হলো, ঠান্ডা পরিবেশে।
- ৫) ঠান্ডা দ্রবণের নিচে ক্রিস্টাল জমতে দেখা গেল। এই ক্রিস্টালকে ঠান্ডা জল দিয়ে পরিষ্কার করা হলো।

### ফলাফল:


**Yield:** 0.84 g (84%)

**Melting point:** 149-151 °C

## Experiment 11: 2-Naphthol aniline dye প্রস্তুতি

**পদ্ধতি:** ২-ন্যাপথল অ্যানিলিন রঞ্জক একটি অ্যাজো রঞ্জক এবং এটি অ্যাজো কাপলিং নামক যুগ্ম বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায়, অ্যানিলিনকে ডায়াজোটাইজেশন এবং ক্ষারীয় দ্রবণে ২-ন্যাপথলের সাথে অ্যাজো কাপলিং বিক্রিয়া ঘটিয়ে লালচে-লাল রঙের ডাই তৈরি হয়।

### বিক্রিয়া:



### উপকরণ:

- ২-ন্যাপথল ( $\beta$ -naphthol)
- অ্যানিলিন
- সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ( $\text{NaOH}$ )
- সোডিয়াম নাইট্রাইট ( $\text{NaNO}_2$ )
- একটি অ্যাসিড, যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ( $\text{HCl}$ )

### প্রস্তুত প্রণালী:

- ২-ন্যাপথলের দ্রবণ তৈরি:** প্রথমে ৪ গ্রাম ২-ন্যাপথলকে ৫ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ( $\text{NaOH}$ ) এর ৫০ ml জলীয় দ্রবণে দ্রবীভূত করে ২-ন্যাপথলের সোডিয়াম লবণ তৈরি করা হয়।
- অ্যানিলিনের ডায়াজোটাইজেশন:** একটি শীতল দ্রবণে (সাধারণত  $0-5^\circ\text{C}$ ) ৫ ml অ্যানিলিনকে পরিমিত ১০ ml লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও ৪ গ্রাম সোডিয়াম নাইট্রাইটের সাথে বিক্রিয়া করিয়ে বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করা হয়।
- অ্যাজো কাপলিং:** এরপর ডায়াজোনিয়াম লবণযুক্ত দ্রবণটিকে ২-ন্যাপথলের ক্ষারীয় দ্রবণে ধীরে ধীরে যোগ করা হয়।
- রঞ্জক উৎপাদন:** এই সংযুক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যাজো যৌগ গঠিত হয়, যা একটি লালচে-লাল রঙের ২-ন্যাপথল অ্যানিলিন ডাই বা [1-ফেনাইলাজো-২-ন্যাপথল](#) হিসেবে পাওয়া যায়।

### ফলাফল:

Yield: 13 g

Melting point:  $126-135^\circ\text{C}$